Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, nº **43** (2008) : 233–254.

CATÁLOGO IBEROBALEAR DE LOS OXYTELINAE (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE)

Purificación Gamarra[1] & Raimundo Outerelo[2]

[1]Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle-UAM. C/La Salle, 10. 28023 Madrid.
[2] Departamento de Biología Animal y Antropología Física. Facultad de Biología. UCM. C/ Antonio Novais, 2. 28040 Madrid.

Resumen: Se presenta el catálogo actualizado hasta el año 2008 de los Staphylinidae Oxytelinae iberobaleares, tomando como base el de De La Fuente (1921,1922). En total se incluyen 105 especies, 11 géneros, 26 subgéneros y 3 tribus. De estos rangos taxonómicos se señalan las correspondientes sinonimias. De cada una de las especies se indica la distribución iberobalear, mediante mapas, donde se señalan las provincias en que se encuentran y se indican las categorías mundiales de su distribución. Se cita de España por primera vez a *Bledius tibialis* (Heer, 1839). Se concreta la presencia de una especie, *Thinodromus arcuatus* (Stephens, 1832).
Palabras clave: Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae, catálogo, sinonimia, mapas de distribución, citas nuevas, Península Ibérica, España, Portugal, Islas Baleares.

Catalogue of the Ibero-Balearic Oxytelinae (Coleoptera: Staphylinidae)

Abstract: A catalogue of the Ibero-Balearic Sptaphylinidae Oxytelinae, updated to 2008, is presented. It is based on De la Fuente's work (1921, 1922). In all, 105 species, 11 genera, 26 subgenera and 3 tribes are included. The relevant synonymies for all these taxonomic levels are given. The Ibero-Balearic distribution of each species is shown by means of maps, with information about the provinces where they are found and their world distribution. One species, *Bledius tibialis* (Heer, 1839), is recorded from Spain for the first time. One species, *Thinodromus arcuatus* (Stephens, 1832), is associated to its localities with certainty.
Key words: Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae, catalogue, synonymy, distribution maps, new records, Iberian Peninsula, Spain, Portugal, Balearic Islands.

En el mundo los Oxytelinae incluyen 2008 especies pertenecientes a 48 géneros. De tamaño pequeño a medio (0,5 mm a 8,5 mm), con coloraciones dominantes entre negro y parduzcas, pero nunca llamativas. Ciertas especies presentan marcado dimorfismo sexuales, presentando los machos cuernos cefálicos o protorácicos muy llamativos. Por tratarse de buenas voladoras, sus especies colonizan gran diversidad de medios.

Las razones y fines para la realización de este Catálogo coinciden con las ya indicadas en los anteriormente publicados por los autores (Gamarra & Outerelo, 2005, 2007, 2008)

Para la realización de este catálogo partimos básicamente de la obra de De La Fuente (1921, 1922), donde aparecen recogidas 72 especies de Oxytelinae, de las que aparecen en las revisiones de las referencias de carácter faunístico del grupo existentes en la bibliografía, las descripciones realizadas con ejemplares procedentes de la Península Ibérica y las determinaciones que hemos realizado empleando materiales procedentes de diversos estudios faunísticos y ecológicos de diferentes regiones españolas enviados por sus recolectores hasta el año 2008.

Sistemáticamente se agrupan en tribus dentro de las cuales los géneros se ordenan alfabéticamente, así como las especies que incluyen.

Para los rangos supragenéricos se ha seguido la obra de Herman (2001).

De cada género se relacionan las sinonimias y especie tipo tomando como base el trabajo de Blackwelder (1952). A continuación de cada taxón supraespecifico figura, entre paréntesis, el número de taxones de rango inferior que engloba.

En cada especie se indica el género en el que fue descrito originalmente, se relacionan las sinonimias y se representa la distribución geográfica ibérica conocida. Para ello se emplean mapas con la división en provincias de España y distritos en Portugal, no concretándose los puntos de muestreo; estos datos se han obtenido de la bibliografía (en los mapas en negro) ampliándose en algunos casos con identificaciones propias de los autores (en los mapas, en gris), en los casos que constituyan una cita nueva o una localización reseñable se concreta la localidad de muestreo.

Así mismo, en cada una de ellas se señalan las categorías zoogeográficas mundiales, para lo cual seguimos la nomenclatura dada por La Greca (1964, 1975) y Vigna-Taglianti *et al.* (1992, 1999) basándonos en las distribuciones recogidas por Bernhauer & Schubert (1911), Scheerpeltz (1933), Smetana (2004) y datos más concretos de revisiones de géneros y grupos de especies recientes.

El listado de todos los rangos taxonómicos se ordena alfabéticamente para facilitar su localización.

La fauna iberobalear de los Oxytelinae recogida en este Catálogo la componen 105 especies, siendo dos dudosas y dos subespecies de especies diferentes, pertenecientes a 11 géneros y 26 subgéneros y tres tribus.

Se cita por primera vez para España la especie:

• *Bledius tibialis* Heer, 1839 en Pontevedra.

Confirmada la presencia de:

• *Thinodromus arcuatus* (Stephens, 1832). Había sido citada en Península Ibérica por Hochhuth (1849).

Consideramos la presencia dudosa de las siguientes especies:

• *Oxytelus migrator* Fauvel, 1904 citada de España por Smetana (2004).

• *Platysthetus degener* Mulsant & Rey, 1878 fue considerada sinonimia de *P.cornutus* hasta 1971 y no hemos encontrado citas concretas de la especie revalidada.

• *Carpelimus insularis* (Kraatz, 1858) esta especie es considerada sinonimia de *C. nigrita* desde 1902, Herman (2001) la sigue considerando como tal. Smetana en su catálogo de 2004 la lista como especie válida y en su distribución señala España, pero no hemos encontrado bibliografia donde se cite *C.insularis* en España.

Hemos encontrado citada erróneamente la especie *Planeustomus cephalotes* (Erichson, 1840), Smetana (2004) la cita de España, quizás arrastrando el error de Herman (2001) que atribuyen su cita en España a Koch (1940), pero consultado este autor vemos que no cita la especie de España. Koch habla de esta especie al citar *Planeustomus kahri* en Panticosa.

Debemos comentar dos especies citadas por Whitehead en 1993 de Mallorca, ya que este autor cita *Ochthephilum jacquelini* (Boieldieu) y *O. fracticorne* (Paykull) pero ambas especies pertencecen al género de Paederinae: *Cryptobium,* por lo que evidentemente no se han incluido dichas citas en este catálogo.

Zoogeográficamente de las especies (teniendo en cuenta las subespecies) presentes en la Península Ibérica: ninguna presenta una distribución Ibérica, tres son hispánicas y una subespecie es lusitanica. Esta distribución nos indica la falta de endemismos en los Oxytelinae.

Familia STAPHYLINIDAE Latreille, 1802

Subfamilia Oxytelinae Fleming, 1821

Tribu DELEASTERINI Reitter, 1909 (1 gen.)

GÉNERO TIPO: *Deleaster* Erichson, 1839

Género *Deleaster* Erichson, 1837 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *D. dichrous* (Gravenhorst, 1802), *Anthophagus*

dichrous (Gravenhorst, 1802), *Anthophagus*
= *adustus* Küster, 1846
= *brassicae* (Scopoli 1763), *Staphylinus nomen oblitum*
= *erichsoni* Hochhuth, 1851
= *leachii* (Curtis, 1830), *Lesteva*
= *testaceicolor* Roubal, 1941 *nomen nudum*
PENÍNSULA IBÉRICA: Citada Pirineos catalanes

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Neártica

Tribu OXYTELINI Fleming, 1821 (3 gen.)

GÉNERO TIPO: *Oxytelus* Gravenhorst, 1802

Género *Anotylus* Thomson, 1859 (15 sp., 1ssp.)
= *Anotylops* Fagel, 1957
= *Boettcherinus* Bernhauer, 1936
= *Emopotylus* Bernhauer, 1910
= *Metoxytelus* Fagel, Coiffait & Saiz, 1968
= *Microxytelus* Fagel, 1956
= *Neoplatystethus* Abdullah & Qadri, 1970
= *Neopyctocraerus* Abdullah & Qadri, 1970
= *Oncoparia* Bernhauer, 1936
= *Oxytelodes* Bernhauer, 1908
= *Oxytelops* Fagel, 1956
= *Oxytelosus* Cameron, 1950
= *Paracoccoporus* Steel, 1948
= *Pseudodelopsis* Fagel, 1957
= *Pseudoplatystethus* Abdullah & Qadri, 1970
= *Pseudopyctocraerus* Abdullah & Qadri, 1970
= *Styloxys* Gozis, 1886
ESPECIE TIPO: *A. sculpturatus* (Gravenhorst, 1806), *Oxytelus*

brevipennis (Fauvel, 1869), *Oxytelus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Tirrénica

clypeonitens (Pandellé, 1867), *Oxytelus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

complanatus (Erichson, 1839), *Oxytelus*
= *chilensis* Coiffait & Saiz, 1968
= *ixellensis* (Dvorák, 1954), *Oxytelus*
= *pallipes* (Stephens, 1832), *Oxytelus nomen preoccupatum*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Australiana y Neotropical

hamatus (Fairmaire & Laboulbène, 1856), *Oxytelus*
PENÍNSULA IBÉRICA: Citada Portugal.

DISTRIBUCIÓN: Euroturánica

insecatus Gravenhorst, 1806
= *nitidus* Stephens, 1832
PENÍNSULA IBÉRICA: Citada Cataluña

DISTRIBUCIÓN: Europea y Neártica

intricatus (Erichson, 1840), *Oxytelus*
= *scaber* (Roshenauer, 1856), *Oxytelus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

inustus (Gravenhorst, 1806), *Oxytelus*
= *excavatus* (Motschoulsky, 1858), *Oxytelus*
= *maxillosus* (Sperk, 1835), *Bledius*
PENÍNSULA IBÉRICA:



DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

nitidulus (Gravenhorst, 1802), *Oxytelus*
= *angustatus* (Stephens, 1834), *Oxytelus*
= *asper* (Mulsant & Rey, 1879), *Oxytelus*
= *borealis* (Motschoulsky, 1860), *Oxytelus*
= *flavipes* (Stephens, 1834), *Oxytelus*
= *pedicellus* (Gravenhorst, 1802), *Oxytelus*
= *punctatus* (LeConte, 1877), *Oxytelus*
= *ruficrus* (Stephens, 1834), *Oxytelus*
= *subnitidus* (Reitter, 1909), *Oxytelus nomen preoccupatum*
= *tunisius* (Bernhauer, 1932), *Oxytelus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita

plagiatus (Rosenhauer, 1856), *Oxytelus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Tirrénica.

plagiatus ssp. *nevesi* (Scheerpeltz, 1951), *Oxytelus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Lusitánica

pumilus (Erichson, 1839), *Oxytelus*
= *spiniventris* (Reitter, 1907), *Oxytelus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

rugosus (Fabricius, 1775), *Staphylinus*
= *basalis* (Melsheimer, 1844), *Oxytelus*
= *carinatus* (Panzer, 1798), *Staphylinus*
= *crenulatus* (Broun, 1880), *Omalium*
= *grafi* (Reitter, 1909), *Oxytelus*
= *picipennis* (Stephens, 1834), *Oxytelus*
= *pulcher* (Gravenhorst, 1802), *Oxytelus*
= *striatus* (Ström, 1768), *Oxytelus*
= *sulcatus* (Geoffroy, 1785), *Staphylinus*
= *terrestris* (Lacordaire, 1835), *Oxytelus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental, Australiana y Neártica

sculpturatus (Gravenhorst, 1806), *Oxytelus*
= *belgicus* (Dvorak, 1954), *Oxytelus*
= *coussementi* (Dvorak, 1954), *Oxytelus nomen nudum*
= *flavipes* (Lacordaire, 1835), *Oxytelus nomen preoccupatum*
= *havelkai* (Dvorak, 1954), *Oxytelus nomen nudum*
= *montivagus* (Heer, 1841), *Oxytelus*
= *terrestris* (Heer, 1839), *Oxytelus nomen preoccupatum*
PENÍNSULA IBÉRICA:



DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

speculifrons (Kraatz, 1858), *Oxytelus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

subanophthalmicus Outerelo, Gamarra & Salgado, 1998
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Hispánica (Cantábrica)

tetracarinatus (Block, 1799), *Staphylinus*
= *opacus* Stephens, 1832), *Oxytelus*
= *pusillus* (Mannerheim, 1830), *Oxytelus nec* Boheman, 1848
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Neártica

Género *Oxytelus* Gravenhorst, 1802 (3 sp.)
= *Basilewskyorus* Fagel, 1957
= *Caccoporus* Thomson, 1859
ESPECIE TIPO: *O.piceus* (Linné, 1767), *Staphylinus*

Subgénero *Epomotylus* Thomson, 1859 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *O.sculptus* Gravenhorst, 1806

sculptus Gravenhorst, 1806
= *antennatus* Stephens, 1834
= *longicornis* Mannerheim, 1830
= *moerens* Melsheimer, 1844
= *pullus* (Broun, 1880), *Omalium*
= *testaceipennis* Fairmaire & Germain, 1861
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita

Subgénero *Oxytelus* Gravenhorst, 1802 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *O.piceus* (Linné, 1767), *Staphylinus*

piceus (Linné, 1767), *Staphylinus*
= *defectivus* Normand, 1839
= *humilis* Heer, 1839
= *japonicus* Motschoulsky, 1862
= *mamillatus* Hochhuth, 1851
= *sulcatus* Gebler, 1848 *nomen preoccupatum*
= *sulcatus* (O.Müller, 1776), *Staphylinus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Etiópica

Subgénero *Tanycraerus* Thomson, 1859 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *O.laqueatus* (Marsham, 1802), *Staphylinus*

laqueatus (Marsham, 1802), *Staphylinus*
= *degener* Palmén, 1939 *nec* Mulsant & Rey, 1878
= *fuscipennis* Mannerheim, 1843 *nomen preoccupatum*
= *luteipennis* Erichson, 1839
= *nitens* Stephens, 1832 *nomen preoccupatum*
= *plagiatus* Motschoulsky, 1860 *nomen preoccupatum*
= *plagifer* Gemminger & Harold, 1868
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Euroasiática, Neártica y Neotropical

Género *Platystethus* Mannerheim, 1830 (9 sp.)
= *Pyctocraerus* Thomson, 1859
ESPECIE TIPO: *P.arenarius* (Geoffroy, 1785), *Staphylinus*

Subgénero *Craetopycrus* Tottenham, 1939 (7 sp.)
ESPECIE TIPO: *P.cornutus* (Gravenhorst, 1806), *Staphylinus*

alutaceus Thomson, 1861
= *tristis* Mulsant & Rey, 1861
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

burlei Brisout, 1861
= *constrictus* Scriba, 1868
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Tirrénica

capito Heer, 1839
= *cribicollis* Baudi, 1848
= *pilosellus* Wankowicz, 1869
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

cornutus (Gravenhorst, 1802), *Oxytelus*
= *maxillosus* Peyron, 1858
= *nigripennis* Gridelli, 1934 *nomen nudum*
= *pallidipennis* Bernhauer, 1906
= *scybalarius* Runde, 1835
PENÍNSULA IBÉRICA: Confirmada la presencia en Cataluña (Parque Natural Cadi-Moixero. Barcelona)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental, Etiópica oriental y Neártica

nitens (Sahlberg, 1832), *Oxytelus*
= *aegyptiacus* Motschoulsky, 1858
= *angustipennis* Scriba, 1868
= *debilis* Hochhuth, 1872
= *laevigatus* Fiori, 1915
= *longicornis* Lucas, 1846
= *punctatus* Fiori, 1915
= *splendens* Heer, 1839
= *striatulus* Heer, 1839
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

nodifrons Mannerheim, 1830
= *asphaltinus* (Waltl, 1838), *Oxytelus*
= *wankowiczi* Hochhuth, 1872
PENÍNSULA IBÉRICA: La cita en Boieiro *et al.* 2001 con autor Shalberg, 1834

DISTRIBUCIÓN: Euroasiática

spinosus Erichson, 1840
= *flavipennis* Luze, 1904
= *fossor* Wollaston, 1854
PENÍNSULA IBÉRICA: Citada Cataluña

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

Subgénero *Platystethus* s.str. (2 sp.)
ESPECIE TIPO: *P.arenarius* (Geoffroy, 1785), *Staphylinus*

arenarius (Geoffroy, 1785), *Staphylinus*
= *brunnipennis* Stephens, 1832
= *caliginosus* Stephens, 1832
= *foveatus* Stephens, 1832
= *immunis* Stephens, 1832
= *mordax* (Sahlberg, 1876), *Oxytelus*
= *morsitans* (Paykull, 1792), *Staphylinus nomen preoccupatum*
= *pallidipennis* (Panzer, 1795), *Staphylinus*
= *striolatus* Lacordaire, 1835
= *trilobus* (Olivier, 1795), *Staphylinus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

oxytelinus Fauvel, 1875
= *longipennis* Eppelsheim, 1875
= *macropterus* Wiese, 1875
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Tirrénica

Tribu THINOBIINI Shalberg 1876 (7 gen.)
GÉNERO TIPO: *Thinobius* Kiesenwetter, 1844

Género *Aploderus* Stephens, 1832 (1sp.)
= *Haploderus* Erichson, 1839
= *Phloeonaeus* Erichson, 1839
ESPECIE TIPO: *A.caelatus* (Gravenhorst, 1802), *Oxytelus*

caelatus (Gravenhorst, 1802), *Oxytelus*
= *biarcuatus* (Matthews, 1838), *Oxytelus*
= *brachypterus* (Marsham, 1802), *Staphylinus nomen preoccupatum*
= *feminalis* Renkonen, 1939
= *spinipes* (Block, 1799), *Staphylinus nomen preoccupatum*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

Género *Bledius* Leach, 1819 (30 sp., 1ssp.)
ESPECIE TIPO: *B. tricornis* (Herbst, 1784), *Staphylinus*

Subgénero *Astycops* Thomson, 1859 (4 sp.)
ESPECIE TIPO: *B.talpa* (Gyllenhal, 1810), *Oxytelus*

fossor Heer, 1839
= *funestus* Eppelsheim, 1833
= *grandicollis* Motschoulsky, 1858
= *triangulum* Baudi, 1848
PENÍNSULA IBÉRICA: Citada Portugal

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

morio Heer, 1839
= *hispidulus* Fairmaire & Laboulbène, 1856
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Tirrénica

subterraneus Erichson, 1839
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Euroasiática

tibialis Heer, 1839
= *pubescens* Kolenati, 1846
PENÍNSULA IBÉRICA: Primera cita para España: Playa de Barra,. Cangas. (Pontevedra)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

Subgénero *Belidus* Mulsant & Rey, 1878 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *B.angustus* Mulsant & Rey, 1861

angustus Mulsant & Rey, 1861
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Etiópica

Subgénero *Bledius* Leach, 1819 (5 sp.)
ESPECIE TIPO: *B. tricornis* (Herbst, 1784), *Staphylinus*

corniger Rosenhauer, 1856
= *cornutissimus* Wollaston, 1864
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea

graellsi Fauvel, 1865
= *antilope* Peyron, 1858 *nomen oblitum*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea

spectabilis Kraatz, 1857
= *tricornis* Fairmaire, 1854 *nec* Herbst *nomen preoccupatum*
PENÍNSULA IBÉRICA: Citada Cataluña

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

tricornis (Herbst, 1784), *Staphylinus*
= *armatus* (Panzer, 1799), *Staphylinus*

= *nuchicornis* Mulsant & Rey, 1861
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

unicornis (Germar, 1825), *Oxytelus*
= *crenulatus* Stierlin, 1867
= *galeatus* Wollaston, 1864
= *gladiator* Normand, 1935
= *hispidus* Parfitt, 1857
= *juvencus* Erichson, 1840
= *monocerus* Rosenhauer, 1856
= *winkleri* Bernhauer, 1905
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Etiópica

Subgénero *Dicarenus* Gistel, 1834 (2 sp.)
ESPECIE TIPO: *B.fergussoni* Joy, 1912

fergussoni Joy, 1912
= *arenarius* (Paykull, 1800), *Staphylinus nomem preoccupatum*
= *arenoides* Tottenham, 1939
= *fuscipennis* Koch, 1934
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

subniger Schneider, 1898
= *secerdendus* Joy, 1911
= *secernendus* Joy, 1912
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Europea occidental

Subgénero *Elbidus* Mulsant & Rey, 1878 (3 sp.)
= *Neobledius* Abdullah & Qadri, 1968
ESPECIE TIPO: *B.bicornis* (Germar, 1823), *Oxytelus*

bicornis (Germar, 1822), *Oxytelus*
= *dama* Motschoulsky, 1858
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Etiópica

plugialis Coiffait, 1976
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Hispánica (Bética)

vitulus Erichson, 1840
= *irmleri* Coiffait, 1980
= *januvianus* Wollaston, 1864
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Etiópica

Subgénero *Euceratobledius* Znojko, 1929 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *B.furcatus* (Olivier, 1811), *Oxytelus*

furcatus (Olivier, 1811), *Oxytelus*
= *ruddi* Stephens, 1832
= *skrimshiranus* Curtis, 1826
= *stephensi* Westwood, 1827
= *taurus* (Germar, 1825), *Oxytelus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Etiópica

Subgénero *Hesperophilus* Stephens, 1829 (15 sp., 1 ssp.)
= *Bargus* Schiodte, 1866
= *Blediodes* Mulsant & Rey, 1878
= *Tadunus* Schiodte, 1866
ESPECIE TIPO: *B.gallicus* (Gravenhorst, 1806), *Oxytelus*

akinini Eppelsheim, 1888
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Euroasiática

atricapillus (Germar, 1825), *Oxytelus*
= *praetermissus* Williams, 1929
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Etiópica

crassicollis Lacordaire, 1835
= *filum* Heer, 1839
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Europea

cribicollis Heer, 1839
= *dissecticollis* Roubal, 1918
= *rufipennis* Erichson, 1840
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

debilis Erichson, 1840
= *mulsanti* Rosenhauer, 1857
PENÍNSULA IBÉRICA: Citada Portugal

DISTRIBUCIÓN: Tirrénica

dissimilis Erichson, 1840
= *affinis* Motschoulsky, 1860
= *erythropeplus* Koch, 1938 *nomen nudum*
= *nigricans* Erichson, 1840
= *simpliciventris* Apfelbeck, 1906
= *sulcicollis* Koch, 1938
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Euroasiática

femoralis (Gyllenhal, 1827), *Oxytelus*
= *sus* Aubé, 1850
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Europea

gallicus (Gravenhorst, 1806), *Oxytelus*
= *alpestris* Heer, 1839
= *erythropterus* Kraatz, 1857
= *fracticornis* (Paykull, 1790), *Staphylinus nomen preoccupatum*
= *laetior* Mulsant & Rey, 1878
= *sharpi* Fowler & Donisthorpe, 1913
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

heterocerus Eppelsheim, 1889
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Normediterránea

longulus Erichson, 1839
= *nigripennis* Bernahuer, 1910 *nomen nudum*
= *nigripennis* Gabriel, 1929 *nomen nudum*
= *pfaundleri* Benick, 1937
= *ruficornis* Mulsant & Rey, 1878 *nomen preoccupatum*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Europea

nanus Erichson, 1840
= *dehnerti* Korge, 1959
= *medioitalicus* Focarile, 1964
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Europea

occidentalis Bondroit, 1907
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Europea occidental

opacus (Block, 1799), *Staphylinus*
= *castaneidennis* Mannerheim, 1830
= *divisus* (Marsham, 1802), *Staphylinus*
= *extensus* Motschoulsky, 1860
= *haemopterus* (Stephens, 1834), *Hesperophilus*
= *krogeri* Scheerpeltz, 1933
= *minor* Krogerus, 1925 *nomen preoccupatum*
= *sinuatocollis* Gerhardt, 1899
= *subsinuatus* Mulsant & Rey, 1878
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

pallipes (Gravenhorst, 1806), *Oxytelus*
= *germanicus* (Gravenhorst, 1806), *Oxytelus*
= *larseni* Hansen, 1940
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Euroasiática

tristis Aubé, 1843
= *brevicollis* Mulsant & Rey, 1861
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Etiópica

tristis ssp. *minarzi* Bernhauer, 1929
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Tirrénica

Subgénero*. Pucerus* Mulsant & Rey, 1878 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *B.verres* Erichson, 1840

verres Erichson, 1840
= *cinctus* Motschoulsky, 1860
= *monachus* Bernhauer, 1914
= *monachus* Cameron, 1981 *nomen preoccupatum*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Etiópica oriental

Género *Carpelimus* Leach, 1819 (22 sp.)
= *Nanolobus* Cameron, 1933
= *Oxytrogus* Wendelere, 1930
= *Thoracoplatynus* Scheerpeltz, 1937
ESPECIE TIPO: *C.fuliginosus* (Gravenhorst, 1802), *Oxytelus*

Subgénero *Boopinus* Klima, 1904 (6 sp.)
ESPECIE TIPO: *C.memnonius* (Erichson, 1840), *Trogophloeus*

anthracinus Mulsant & Rey, 1861
= *cooperi* (Cameron, 1951), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

insularis (Kraatz, 1858), *Trogophloeus*
= *papuensis* (Fauvel, 1879), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA: Era sinonímia de *nigrita* por lo que no hay citas de España

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Etiópica oriental

memnonius (Erichson, 1840), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental

nigrita (Wollaston, 1854), *Trogophloeus*
= *calidus* (Kraatz, 1858), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Etiópica oriental

obesus (Kiesenwetter, 1844), *Trogophloeus*
= *fossulatus* (Motschoulsky, 1857), *Trogophloeus*
= *mancus* (Casey, 1889), *Trogophloeus*
= *spectatus* (Casey, 1889), *Trogophloeus*
= *tarsalis* (Hochhuth, 1849), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA: Citada Cataluña



DISTRIBUCIÓN: Euroasiática, Australiana y Neártica

politus (Kiesenwetter, 1850), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

Subgénero *Carpelimus s.str.* Leach, 1819 (2 sp.)
ESPECIE TIPO: *C.fuliginosus* (Gravenhorst, 1802), *Oxytelus*

fuliginosus (Gravenhorst, 1802), *Oxytelus*
= *pusillus* (Stephens, 1834), *Trogophloeus nec* Gravenhorst
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Etiópica

rivularis (Motschoulsky, 1860), *Trogophloeus*
= *marchicus* Wagner, 1916 *nomen nudum*
= *metuens* Mulsant & Rey, 1879
= *obscurus* Stephens, 1834 *nomen oblitum*
= *spretus* (Casey, 1889), *Trogophloeus*
= *subaequus* (Mulsant & Rey, 1879), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Neártica

Subgénero *Paraboopinus* Scheerpeltz, 1937 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *C.nitidus* (Baudi, 1848), *Trogophloeus*

nitidus (Baudi, 1848), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

Subgénero *Paratrogophloeus* Hatch, 1957 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *C.bilineatus* Stephens, 1834

bilineatus (Stephens, 1832), *Trogophloeus*
= *caucasicus* (Hochhuth, 1849), *Trogophloeus*
= *lathrobiodes* (Peyron, 1858), *Trogophloeus*
= *riparius* (Lacordaire, 1835), *Trogophloeus*
= *sobrinus* (Fairmaire & Germain, 1861), *Trogophloeus*
= *suspectus* (Mulsant & Rey, 1879), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita

Subgénero *Taenosoma* Mannerheim, 1830 (3 sp.)
= *Glomus* Gistel, 1848
ESPECIE TIPO: *C.pusillus* (Gravenhorst, 1802), *Aleochara*

alutaceus (Fauvel, 1898), *Trogophloeus*
= *championi* (Cameron, 1912), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Tirrénica

punctipennis (Kiesenwetter, 1850), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

pusillus (Gravenhorst, 1802), *Aleochara*
= *affinis* Stephens, 1834
= *evertsi* (Bernhauer, 1915), *Trogophloeus*
= *lasti* (Scheerpeltz, 1946), *Trogophloeus*
= *lindbergi* (Scheerpeltz, 1937), *Trogophloeus*
= *picipennis* Stephens, 1834
= *rufipennis* Stephens, 1834
= *tantillus* (Casey, 1889), *Trogophloeus*
= *thessalonicensis* (Scheerpeltz, 1963), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental, Australiana y Neártica

Subgénero *Troginus* Mulsant & Rey, 1878 (3 sp.)
ESPECIE TIPO: *C.exiguus* (Erichson, 1839), *Trogophloeus*

despectus (Baudi, 1870), *Trogophloeus*
= *despectus* (Mulsant & Rey, 1870), *Trogophloeus*
= *leederi* (Bernhauer, 1940), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Euroasiática

exiguus (Erichson, 1839), *Trogophloeus*
= *aberrans* (Rosenhauer, 1856), *Trogophloeus*
= *bledioides* (Wollaston, 1864), *Trogophloeus*
Trogophloeus nec Baudi
= *glabricollis* (Motschoulsky, 1860), *Trogophloeus*
= *luteicornis* (Mulsant & Rey, 1879), *Trogophloeus*
= *minusculus* (Motschoulsky, 1861), *Bledius*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Etiópica, Australiana oriental

rondaensis (Fagel, 1957), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Hispánica (Bética)

Subgénero *Trogophloeus* Mannerheim, 1830 (6 sp.)
ESPECIE TIPO: *C.corticinus* (Gravenhorst, 1806), *Oxytelus*

corticinus (Gravenhorst, 1806), *Oxytelus*
= *atratus* Stephens, 1834
= *dispersepunctatus* (Scheerpeltz, 1947), *Trogophloeus*
= *fulvipennis* (Fauvel, 1863), *Trogophloeus*
= *minimus* (Runde, 1835), *Oxytelus*
= *nanus* (Wollaston, 1854), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Australiana, Neártica y Neotropical

foveolatus (Sahlberg, 1827), *Oxytelus*
= *gradensis* (Bernhauer, 1914), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

gracilis (Mannerheim, 1830), *Taenosoma*
= *graciliformis* Konzelmann & Lohse, 1981
= *littoralis* (Mulsant & Rey, 1879), *Trogophloeus*
= *tenellus* (Erichson, 1839), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Neártica

halophilus (Kiesenwetter, 1844), *Trogophloeus*
= *curtipennis* (Mulsant & Rey, 1878), *Trogophloeus*
= *subangulatus* (Jarrige, 1964), *Trogophloeus*
= *subrugulosus* (Mulsant & Rey, 1878), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental

impressus (Lacordaire, 1835), *Trogophloeus*
= *affinis* (Heer, 1839), *Trogophloeus nomen preoccupatum*
= *incrassatus* (Kiesenwetter, 1850), *Trogophloeus*
= *inquilinus* (Erichson, 1839), *Trogophloeus*
= *obsoletus* (Mulsant & Rey, 1878), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

parvulus (Mulsant & Rey, 1861), *Oxytelus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Tirrénica

Género *Ochthephilus* Mulsant & Rey, 1856 (10 sp.)
= *Ancyrophorus* Kraatz, 1857
= *Ochthphilinus* Eichelbaum, 1915
= *Stictancyrus* Scheerpeltz, 1950
ESPECIE TIPO: *O.flexuosus* Mulsant & Rey, 1856

Subgénero *Misancyrus* Gozis, 1886 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *O.emarginatus* (Fauvel, 1871), *Ancyrophorus*

emarginatus (Fauvel, 1871), *Ancyrophorus*
= *elegans* (Luze, 1904), *Psilotrichus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

Subgénero *Ochthephilus s.str.* Mulsant & Rey, 1856 (9 sp.)
ESPECIE TIPO: *O.flexuosus* Mulsant & Rey, 1856

andalusiacus (Fagel, 1957), *Ancyrophorus*
= *rivularis* (Smetana, 1967), *Ancyrophorus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Europea occidental

angustatus (Erichson, 1840), *Troglophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Tirrénica

aureus (Fauvel, 1872), *Ancyrophorus*
= *lucifugus* (Fagel, 1951), *Ancyrophorus*
= *oblitus* Mulsant & Rey 1879
= *ruficornis* (Reitter, 1909), *Ancyrophorus*
PENINSULA IBERICA:

DISTRIBUCIÓN: Holomediterránea

filum (Fauvel, 1872), *Ancyrophorus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Tirrénica

flexuosus Mulsant & Rey, 1856
= *flexuosus* (Fairmaire & Laboulbène, 1856), *Trogophloeus nomen preoccupatum*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Europea occidental

mediterraneus (Scheerpeltz, 1950), *Ancyrophorus*
PENÍNSULA IBÉRICA: Citada Sur de España

DISTRIBUCIÓN: Tirrénica

omalinus (Erichson, 1840), *Trogophloeus*
= *homalinus* (Fauvel, 1871), *Ancyrophorus*
= *homalinus* (Sainte-Claire Deville, 1907), *Ancyrophorus*
= *parvulus* (Eppelsheim, 1878), *Ancyrophorus*
PENÍNSULA IBÉRICA: Una antigua sinonimia *venustulus* descrita de Cádiz es considera especie válida por lo que la cita de esa ciudad puede ser o no de *omalinus.*

DISTRIBUCIÓN: Holomediterránea occidental

rosenhaueri (Kiesenwetter, 1850), *Trogophloeus*
= *gracilis* (Fagel, 1951), *Ancyrophorus*
= *longipennis* (Fairmaire & Laboulbène, 1856), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Euroasiática

venustulus (Rosenhauer, 1856), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Europea occidental

Género *Planeustomus* Jacquelin du Val, 1857 (4 sp.)
= *Compsochilus* Kraatz, 1857
ESPECIE TIPO: *P.palpalis* (Erichson, 1839), *Acrognathus*

curtipennis (Fauvel, 1869), *Compsochilus*
= *weberi* (Quedenfeldt, 1882), *Compsochilus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Tirrénica

elongatulus (Kraatz, 1858), *Compsochilus*
= *filiformis* (Quedenfeldt, 1882), *Compsochilus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Holomediterránea

kahrii (Kraatz, 1858), *Compsochilus*
= *macellus* (Kraatz, 1870), *Compsochilus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN:Holomediterránea occidental

palpalis (Erichson, 1839), *Acrognathus*
= *alutaceus* Gerhardt, 1910
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Europea

Género *Thinobius* Kiesenwetter, 1844 (4 sp.)
= *Torrentomus* Bierig, 1934
= *Yosiityphlus* Sawada, 1971
ESPECIE TIPO: *T.ciliatus* Kiesenwetter, 1844

Subgénero *Thinobius s.str.* Kiesenwetter, 1844 (3 sp.)
ESPECIE TIPO: *T.ciliatus* Kiesenwetter, 1844

brevipennis Kiesenwetter, 1850
= *benicki* Smetana, 1960
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Euroasiática

ciliatus Kiesenwetter, 1844
= *praetor* Smetana, 1959
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Europea

longipennis (Heer, 1841), *Homalota*
= *wenckeri* Fauvel, 1863
= *opacus* Mulsant & Rey, 1878
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Euroasiática

Subgénero *Thiphonilus* Tottenham, 1939 (1 sp.)
= *Thinophilus* Mulsant & Rey, 1878 *nomen preoccupatum*
ESPECIE TIPO: *T.linearis* Kraatz, 1858

heterogaster Fauvel, 1889
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Normediterránea occidental

Género *Thinodromus* Kraatz, 1857 (7 sp.)
= *Warburtonia* Oke, 1933
ESPECIE TIPO: *T.dilatatus* (Erichson, 1839), *Trogophloeus*

Subgénero *Amisammus* Gozis, 1886 (5 sp.)
ESPECIE TIPO: *T.arcuatus* (Stephens, 1834), *Carpelimus*

arcuatus (Stephens, 1832), *Carpelimus*
= *nigricornis* (Mulsant & Rey, 1879), *Trogophloeus*
= *scrobiculatus* (Erichson, 1840), *Trogophloeus*
PENINSULA IBERICA: Confirmada su presencia en Los Monegros (Zaragoza).

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

distinctus (Fairmaire, 1856), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Euroasiática

mannerheimi (Kolenati, 1846), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

plagiatus (Kiesenwetter, 1850), *Trogophloeus*
= *brevissonii* (Fauvel, 1865), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA: Citada Andalucia

DISTRIBUCIÓN: Tirrénica

transversalis (Wollaston, 1857), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y asiática

Subgénero *Thinodromus s.str.* Kraatz, 1857 (2 sp.)
ESPECIE TIPO: *T.dilatatus* (Erichson, 1839), *Trogophloeus*

dilatatus (Erichson, 1839), *Trogophloeus*
PENÍNSULA IBÉRICA:

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental

hirticollis Mulsant & Rey, 1879
PENÍNSULA IBÉRICA: Primera cita para España Los Monegros (Zaragoza).

DISTRIBUCIÓN: Holomediterránea occidental.

AGUIAR, C.A.S. & A.R.M. SERRANO 1995. Estudo faunístico e ecológico dos coleópteros (Insecta, Coleoptera) do concelho de Cascais (Portugal). *Bolm. Soc. port. Ent.,* **155** (VI-5): 41-68.

BOIEIRO, M., A.R.M. SERRANO & C.A.S. AGUIAR 1999. Contribuiçao para o conhecimento dos coleópteros estafilinídeos de Portugal (Coleoptera, Staphylinidae). *Boln. SPEN*, supl. **6**: 59-69.

BORDONI, A. 1973. I Coleotteri Staphylinidi delle isole circumsiciliane. XXI contributo alla conoscenza degli *Staphylinidae*. *Lavori della Societá Italiana di Biogreografia*, **III**(1972): 651-754.

CARDONA, F. 1872. *Catálogo metódico de los coleópteros de Menorca.* Mahón (Tip. Fábregues hermanos): 123 pp.

CARDONA, F. 1875. *Doscientos coleópteros más de Menorca.* Mahón (Imp. M.Parpal): 23 pp.

CARDONA, F. 1878. *Otros cien coleópteros más de Menorca.* Mahón (Imp. M.Parpal): 14 pp.

CASTILLO-MIRALBÉS, M. 1999-2004. Especies de coleópteros de las familias Staphylinidae e Histeridae presentes en carroña de cerdos, en la comarca de La Litera (Huesca). *Lucas Mallada*, **11**: 81-91.

CHAMPION, G.CH. 1898. A list of Cincindelidae, Carabidae and Staphylinidae collected by Mr. J.J. Walker.R.N.,F.L.S. in the region of the straits of Gibraltar. *Trans. Entomol. Soc. London,* **1**: 65-103.

CHAMPION, G.CH. 1902. An Entomological Excursion to Central Spain. *Trans. Entomol. Soc. London,* **1902** (part I): 115-129.

CHAMPION, G.CH. 1903. An Entomological Excursion to Bejar, Central Spain. *Trans. Entomol. Soc. London,* **1903** (part II): 165-182.

COBOS, A. 1949. Datos para el catálogo de los coleópteros de España. Especies de alrededor de Málaga. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.,* **XLVII**: 563-609.

COIFFAIT, H. 1963. Voyage au Portugal du Dr. K.Lindberg résultats zoologiques. 4. Coléoptères cavernicoles. *Boletin Sociedade Portuguesa de Ciencias Naturais*, **9**(2): 90-99.

COIFFAIT, H. 1976. Nouveaux Staphylinides et *Mayetia* d'Espagne et des Canaries. *Nouv. Rev. Ent.,* **VI**(1): 55-59.

COMPTE, A. 1968. *La fauna de Menorca y su origen. (Síntesis de la fauna de Menorca, su naturaleza y un ensayo acerca de su origen).* Publ. Ateneo. Mahón, Menorca. 212 pp.

COMPTE, A. & M. CAMINERO 1982. Las comunidades de coleópteros xilófagos de las encinas de los alrededores de Madrid. *Graellsia,* **XXXVIII**: 201-217

CODINA, A. 1915. Excursió entomològica a la Vall d'Aran. *Butll. Inst. Catal. Hist. Nat.,* **15**: 120-121.

CORREA, J.M. 1924. Notas entomológicas. *Ann. do Inst. de Zool. da Univers. do Pórto,* **1**: 1-11.

CORREA, J.M. 1926. Notas entomológicas. *Memórias e estudos do Museu Zoológico da Universidade de Coimbra*, ser. 1, **6**: 7-16.

CORREA, J.M. 1927. Notas entomologicas. Coleopteros novos para a fauna portuguesa. *Broteria, ser. Zoologica*, **XXIV**: 141-143.

CUNI, M. 1885.-Excursión Entomolológica a varias localidades de la provincia de Gerona (Cataluña). *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, **14**: 1-23.

CUNI, M. 1888. Insectos observados en los alrededores de Barcelona. *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, **17**: 133-195.

CUNI, M. 1889. Insectos que recogí en Begas en Mayo de 1887. *Actas Soc. esp. Hist. Nat.*, **18**: 62-66.

CUNI, M. 1897. Fauna entomológica de la Villa de Calella (Cataluña, provincia de Barcelona). *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural,* **26**(6): 281-339.

CUNÍ, M. & M. MARTORELL 1876. *Catálogo metódico y razonado de los Coleópteros observados en Cataluña.* Barcelona (Impr. Gorchs). 360 pp.

DE LA FUENTE, J.M. 1919. Lista inédita de Coleópteros de España. *Bol.R. Soc. esp. Hist. Nat.,* **XIX** (4): 178-188.

DE LA FUENTE, J.M. 1921. Catálogo sistemático-geográfico de los Coleópteros observados en la Península Ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares. *Boletín de la Sociedad Entomológica de España,* **IV** (7-8): 150-153.

DE LA FUENTE, J.M. 1922. Catálogo sistemático-geográfico de los Coleópteros observados en la Península Ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares. *Boletín de la Sociedad Entomológica de España,* **V**(1-2): 21-34.

DRUGMAND, D. & R. OUTERELO 1997. Les Staphylinidae endémiques de l´ouest de l´Éurope continentale (Coleoptera): premiers résultats. *Documents de Travail de l´I.R.Sc.N. B.*, Bruxelles, **87**: 1-150.

ESPAÑOL, F. 1945. Coleópteros nuevos o interesantes para la fauna Ibero-Balear. *Eos*, **21**(1): 83-105.

ESTELRICH, P., I. MORAGUES & J. CAPDEBOU 1885. *Catálogo metódico de los Coleópteros observados en la Islas Baleares.* (Tip. Bartolomé Rotger). Palma. 24 pp.

FAGEL, G. 1951. Contribution a connaissance des Staphylinidae. V.- Sur quelques *Ancyrophorus* européens. *Bull. Ann. Soc. Roy. Ent. Belg.,* **XXVII** (22): 1-12.

FAGEL, G. 1957. Contribution à la connaissance des *Staphylinidae*. XLII- Sur quelques espèces d'Andalousie. *Bull. Ann. Soc. Roy. Ent. Belg.,* **93** (IX-X): 276-282.

FAGEL, G. 1968. Contribution a la connaissance des Staphylinidae. CVI.- Remarqués diverses sur des espèces de la Région paléarctique occidentale. *Bull. Ann. Soc. Roy. Ent. Belg.,* **106**: 190-204.

FAGEL, G. 1970. Contribution a la connaissance des Staphylinidae. CXL.- Sur quelques *Bledius* du sous-genre *Elbidus* Rey de la Région paléarctique occidentale. *Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg.,* **46** (21): 1-12.

FERREIRA, R.N. 1962. Contribuiçóes para um catálogo da familia Staphylinidae da fauna portuguesa. I Estado actual do conhecimiento dos Estafilinídeos Portugueses. *Mém. est. Mus. Zool. Univ. Coimbra,* **280**: 1-21.

GAMARRA, P. & R. OUTERELO 1986. Diversos casos teratológicos en Estafilinoideos (Coleoptera, Staphylinoidea). *Actas de las VIII Jornadas de la AeE, Sevilla. Octubre.*

GÓRRIZ, R. J. 1902. Coleópteros de la cuenca del Ebro. *Boln. Soc. Aragon. Cienc. Nat.*, **1**(2): 21-23, 51-52, 154-155, 180-186.

HERMAN, L.H. 1986. Revision of *Bledius.* Part IV. Classification of species grouops, phylogeny, natural history, and catalogue (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae). *Bulletin American Museum of Natural History,* **184** (article 1): 1-368.

HORION, A.D. 1963. *Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer. Staphylinidae. 1. MICROPEPLINAE bis EUASTHETINAE. 9*: 412 pp. Überlingen-Bodensee.

JARRIGE, J. 1954. Coléoptères de la Sierra Nevada. «Staphylinidae». *Arch. Inst. Aclim.Almería*, **2**: 73-79.

JEANNEL, R. & J. JARRIGE 1949. Biospeologica. LXVIII. Coléopteres Staphylinides. *Arch. De Zool. Exp. Et Gén.,* **86**: 255-392.

KIESENWETTER, E.A.H. 1851. Énumération des coléoptères trouvés dans le midi de la France et en Catalogne. *Ann.Soc.ent. France,* **2** (9): 385-440.

KOCH, C. 1940. Resultados científicos de los viajes entomológicos en España patrocinados por Su Alteza el Príncipe Alessandro C. Della Torre e Tasso. *VI Con. Intern. Entom., 1935*: 369-390.

LAGUNA, M.A. 1902. Coleópteros recogidos durante el mes de Marzo. *Boln.Soc.Aragon.Cienc.Nat.,* **1**(4): 76-78.

LINDBERG, H. 1931. Inventa entomologica itineris Hispanici et Maroccani, quod a. 1926 fecerunt Harald et Hakan Lindberg. *Soc. Scient. Fenn., Comm. Biol.,* **III** (12): 1-29.

LÓPEZ, R. 1956. Insectos interesantes o nuevos de Mallorca. *Boll. Soc. Hist. Nat. Baleares*, **2**(1-4) : 27-32.

MARTÍNEZ, F. 1877. Sobre dos especies de *Ancyrophorus* de Madrid. *Actas Soc. esp. Hist. nat.*, **6**: 46.

MARTÍNEZ, F. 1886. Coleópteros recogidos en España y Norte de África. *Actas Soc. esp. Hist. nat.*, **15**: 48-55.

MARTORELL, M. 1879. *Catálogos sinonímicos de los insectos encontrados en Cataluña, aumentados con los recientes hallados por el Autor, en los diversos órdenes de los: Coleópteros, Hemípteros, Hymenópteros, Ortópteros, Lepidópteros, Dípteros y Neurópteros.* (Tip. Sucesores de N. Ramirez y Cª). Barcelona. 200 pp.

MEDINA, M. 1895. Coleópteros de Andalucía existentes en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Sevilla. *Actas Soc. esp. Hist. nat.*, **24**: 25-61.

MELÓN, A.A. 1903. Excursión del día 26 de abril de 1903. *Boln. Soc. Aragon. Cienc. Nat.,* **2**(7): 198-201.

MONZÓ, C., P. VANACLOCHA, R. OUTERELO, I. RUIZ-TAPIADOR, D. TORTOSA, T. PINA, P. CASTAÑERA & A. URBANEJA 2005. Catalogación de especies de las familias Carabidae, Cicindelidae y Staphylinidae en el suelo de los cítricos de la provincia de Valencia, España. *Bol. San. Veg. Plagas*, **31**: 483-492.

MORAGUES, F. 1889. Coleópteros de Mallorca. *Ann. Soc. Esp. Hist. Nat.*, **18** : 11-34.

MORER, F. 1918. Notes sobre Staphilinidae de Catalunya. *Butlletí Intitució Catalana d'Historia Natural*, **1**(1) : 21-22.

MORODER, E. 1923. Coleópteros del lago de la Albufera de Valencia. *Bol.Real Soc. Esp. Hist. Nat.,* **XXIII**: 70-75.

MOTCHOULSKY, V. 1849. Coléoptères reçus d'un voyage de M.Handschuh dans le midi de l'Espagne, enumerés et suivis de notes. *Bull. Soc. Imp. Nat.,* **XXII** (I) : 52-163.

NAVAS, L. 1902. Una excursió científica a la Serra Nevada. *Boln. Inst. Cat.. Hist. Nat.*, **9-15**: 29-36, 46-50, 68-74, 85-90, 100-105, 113-120.

NAVAS, L. 1904. Excursión al Moncayo. *Bol. Soc. Aragon. Cienc. Nat.*, **3**(5/6): 139-167.

NAVAS, L. 1909. Una visita a Valdealgorfa (Teruel). *Boln. Soc. Aragon. Cienc. Nat.*, **8**(9/10): 195-197.

NAVAS, L. 1924. Excursió Entomològica al Cabrerés (Girona-Barcelona) del 8 al 18 de Julio de 1923. *Treb. Mus. Ciènc. nat. Barcelona.* **4** (10): 1-59.

NEVES, R.S.F. 1941. Notas entomológicas. *Mem. Est. Mus. Zool. Univ. Coimbra,* ser.I, **148**: 1-5.

NEUMANN, K. 1907. Einiges über Staphyliniden. (Col.) Die Typen und Originale aus der Sammlung des Pfarrers D.Scriba. *Deutsch. Ent. Zeitschr.,* **1907**: 327-330.

NOTARIO, A. & I. CASTRESANA 2004. Contribución al estudio de la Entomofauna del monte del Estado Selladores-Contadero (Jaén). *Invest. Agrar. Sist. Recur. For.*, Fuera de serie: 191-200.

NOTARIO, A., I. CASTRESANA & L. LOPEZ ARCE 1995. Contribucion al estudio de la entomofauna del monte del estado Lugar nuevo (Jaén). *Ecología*, **9**: 447-463.

OLIVEIRA, P. D' 1876. *Catalogue des Insectes du Portugal: Staphylinidae.* Universidade Coimbra: 115 pp.

OLIVEIRA, P. D' 1885. *Catalogue des Insectes du Portugal: Staphylinidae.* Universidade Coimbra: 15 pp.

OLIVEIRA, P. D' 1894. *Catalogue des Insectes du Portugal: Staphylinidae.* Coimbra: 393 pp.

OUTERELO, R. 1980. *Los Stafilinoideos de la Sierra de Cazorla (Jaén)*. *In* De Viedma, M.G. (Edit.). Fauna de Cazorla Invertebrados. ICONA, Monografias 23: 53-71.

OUTERELO, R. 1981. *Los Staphylinidae (Coleoptera Polyphaga) de la Sierra de Guadarrama*. Tesis doctoral. Ed. Universidad Complutense de Madrid, 913 pp.

OUTERELO, R., P. GAMARRA & A. ARANDA 2001. Los Staphylinidae (Coleoptera) del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, Ciudad Real (España). *Ecología*, **15**: 243-268.

OUTERELO, R., P. GAMARRA & J.M. SALGADO 1998. Los Staphylinidae cavernícolas del noreste de la Península Ibérica (I). *Mémoires de Biospéologie*, **25**: 11-137.

OUTERELO, R., P. GAMARRA & J. M. SALGADO 2000. Los Staphylinidae (Coleoptera) cavernícolas del Noroeste de la Península Ibérica.II. Campañas de 1985 a 1996. *Mémoires de Biospéologie*, **27**: 107-121.

OUTERELO, R., M. PALMER & G. X. PONS 1995. Staphylinidae y Pselaphidae (Coleoptera, Staphylinoidea) de s'Albufera de Mallorca (Islas Baleares). *Boll. Soc. Hist. Nat. Balears,* **38**: 75-88.

QUEDENFELDT, I. 1883. Beiträge zur Kenntniss der Staphyliniden-Fauna von Süd-Spanien, Portugal und Marokko. *Berliner Entomolog. Zeitschrift*, **XXVII** (I): 149-163.

QUEDENFELDT, I. 1884. Beiträge zur Kenntniss der Staphyliniden-Fauna von Süd-Spanien, Portugal und Marokko. *Berliner Entomolog. Zeitschrift*, **XXVIII** (II): 351-379.

ROSENHAUER, W.G. 1856. *Die Thiere Andalusiens nach dem Resultate einer Reise zusammengestellt, nebst den Beschriebungen von 249 neuen oder bis jetzt noch unbeschriebenen Gattungen und Arten*. Ed: T.Blaesing. 429 pp.

SALVAÑA, J. 1870. *Apuntes para la geografia y fauna entomológicas de Mataró.* Madrid. 44 pp.

SCHEERPELTZ, O. 1950. Die paläarktischen Arten der Gattung *Ancyrophorus* Kr. (Col. Staphylinidae) . *Norsk Ent. Tidsskr.,* **VIII** : 51-76.

SCHEERPELTZ, O. 1951. Neue Staphyliniden aus Portugal, Col.,49. Beitrage zur Kenntnis der paläarktischen staphyliniden. *Eos*, **XXVII** (1º): 97-141.

SCHEERPELTZ, O. 1958. Wissenschaftliche Ergebnisse der von Dr. Steiner in Rahmen der Untersuchungen der Bodenfauna verschiedener Lokalitäten in Spanien durchgeführten Aufsammlungen von Staphyliniden. *Eos*, **XXXIV** (2º): 171-204.

SCHEERPELTZ, O. 1960. Die von Prof. Dr. Häkan Lindberg während seiner 1959 nach Portugal unternommenen Studienreise aufgesammelten Staphyliniden (Col.). (106 Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Staphyliniden). *Notulae Entomologicae*, **40**: 132-139.

SCHÜLKE, M. 1998. Zur Identität einiger westpaläarktischer Arten der Gattung *Thinobius* Kiesenwetter, 1844 (Col. Staphylinidaer, Oxytelinae). *Entomologische Nachrichten und Berichte*, **42**: 127-138.

SCHÜLKE, M. 2008.- Bledius dehnerti Korge, 1959 ein neues synonym von B.nanus Erichson, 1840 (Coleoptera, Staphylinidae, Oxypodinae). *Linzer biol. Beitr.*, **40**(1): 921-926.

SEABRA, A.F. 1942. Aditamento ao Catálogo dos Coleópteros de Portugal, do Dr Manuel Paulino de Oliveira. *Memórias e Estudos do Museo Zoológico da Universidade de Coimbra*. **136**: 1-33.

SEABRA, A. F. 1943. Contribuiçoes para o inventário da fauna lusitânica. *Memórias e Estudos do Museo Zoológico da Universidade de Coimbra*. **141**: 21-151.

SERRANO, A. 1981. *Contribuçao para o estudo dos Coleópteros do Parque Natural da Arrábida.* Colecçao « Parques Naturais », **9**. SNPRCN Eds. Lisboa.

SERRANO, A. 1983. *Contribuçao para o inventário dos Coleópteros em Portugal.* Instituto Nacional de Investigaçao Agrária Estçao Agronomica Nacional. Oeiras.

SERRANO, A. 1987. Contribuçao para o conhecimento dos Coleópteros (Insecta, Coleoptera) da praia e das dunas de Vila Real de STº António-Monte Gordo. *Arq. Mus. Boc. (Série A)*, **3**(11): 197-218.

SMETANA, A. 1960. Eine neue Art der Gattung *Thinobius* Kiesw. aus dem Mittelmeergebiet (Col., Staphylinidae). *Entomol. Ts. Arg.,* **81**(1-2): 22-24.

VIVES, J. & E. VIVES 1978. Coleópteros halófilos de Los Monegros. *Bol. Asoc. Esp. Ent.,* **2**: 205-214.

WAGNER, H. 1926. Eine Sammelreise nach Zentral-Spanien. *Coleopterologisches Centralblatt,* **1**(1): 68-80.

WAGNER, H. 1927. Eine Sammelreise nach Zentral-Spanien. (I. Fortsetzung). *Coleopterologisches Centralblatt,* **2**(1): 103-120.

WHITEHEAD, P.F. 1993. Observations on Coleoptera of Mallorca, Balearic Islands. *Boll. Soc. Hist. Nat. Balears,* **36**: 45-56.

ZARIQUIEY, R. 1915. Coleópteros catalanes cazados durante el año 1915. *Butll. Inst.Catal.Hist.Nat.,* **9**: 152-154.

Bibliografía citada

BERNHAUER, M. & K. SCHUBERT 1911. Staphylinidae V. *In* Schenkling. *Coleopterorum Catalogus*, **5**(29): 91-137.

BLACKWELDER, R.E. 1952. The generic names of the beetle family Staphyninidae, with an essay on genotypy. *United States National Museum Bulletin,* **200**: 1-483.

BOHAC, J. 1999. Staphylinid beetles as bioindicators. *Agric. Ecos. Envir*., **74**: 357-372.

DE LA FUENTE, J.M. 1921. Catálogo sistemático-geográfico de los Coleópteros observados en la península ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares. *Boletín de la Sociedad Entomológica de España,* **IV** (7-8): 150-153 .

DE LA FUENTE, J.M. 1922. Catálogo sistemático-geográfico de los Coleópteros observados en la península ibérica, Pirineos propiamente dichos y Baleares. *Boletín de la Sociedad Entomológica de España,* **V** (1-2): 21-34.

GAMARRA, P. & R. OUTERELO 2005. Catálogo Iberobalear de los Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae). *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa*, **37**: 1-81.

GAMARRA, P. & R. OUTERELO 2007.- Catálogo Iberobalear de los Paederinae (Coleoptera: Staphylinidae). *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa*, **40**: 1-37.

GAMARRA, P. & R. OUTERELO 2008. Catálogo Iberobalear de los Staphylininae (Coleoptera: Staphylinidae). *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa,* **42**: 197-251.

HERMAN, L.H. 2001. Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). 1758 to the end of the second millennium. Part III. Oxyteline group. *Bulletin American Museum of Natural History,* **265**: 1067-1806.

HOCHHUTH, J.H. 1849. Die Staphylinen-Fauna des Kaukasus und Transkaukasiens. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes Moscou,* **22**(1): 18-214.

KOCH, C. 1940. Resultados científicos de los viajes entomológicos en España patrocinados por Su Alteza el Príncipe Alessandro C. Della Torre e Tasso. *VI Congreso Intern. Entom., 1935*: 369-390.

LA GRECA, M. 1964. Le categorie corologiche degli elementi faunistici italiani. *Mém. Soc. Ent. Ital.,* **XLIII**: 147-165.

LA GRECA, M. 1975. La caratterizzazione degli elementi faunistici e le categorie corologiche nella ricerca zoogeografica. *Animalia*, **2**: 101-129.

NEWTON, A. F. JR. & M. K. THAYER 1992. Current classification and family-group names in Staphylinifornia (Coleoptera). *Fieldiana Zoology (n.ser),* **67**: 1-92.

SMETANA, A. 2004. Staphylinoidea, pp. 511-535. *In* I.Löbl & A.Smetana (ed.): *Catalogue of Palaeartic Coleoptera*, Vol.2. 942 pp.

SCHEERPELTZ, O. 1933. Staphylinidae VI. *In* Schenkling. *Coleopterorum Catalogus*, 6 (129): 1073-1127.

VIGNA-TAGLIANTI, A., P. ALDO-AUDISIO, C. BELFIORE, M. BIONDI, M.A. BOLOGNA, G.M. CARPANETO, A. DE BIASE, S. DE FELICI, E. PIATTELLA, T. RACHELI, M. ZAPPAROLI & S. ZOIA 1992. Reflessioni di gruppo sui carotipi fondamentali della fauna W-paleartica ed in particolare italiana. *Biogeographia*, **XVI**: 159-179.

ÍNDICE

En cursiva las especies válidas, en negrita los taxones supraespecíficos válidos y en redonda las sinonimias

aberrans (Rosenhauer, 1856) 245
adustus Küster, 1846 234
aegyptiacus Motschoulsky, 1858 238
affinis (Heer, 1839) 246
affinis Stephens, 1834 245
affinis Motschoulsky, 1860 241
akinini Eppelsheim, 1888 241
alpestris Heer, 1839 242
alutaceus (Fauvel, 1898) 244
alutaceus Gerhardt, 1910 248
alutaceus Thomson, 1861 237
Amisammus Gozis, 1886 248
Ancyrophorus Kraatz, 1857 246
andalusiacus (Fagel, 1957) 246
angustatus (Erichson, 1840) 246
angustatus (Stephens, 1834) 235
angustipennis Scriba, 1868 238
angustus Mulsant & Rey, 1861 239
Anotylops Fagel, 1957 234
Anotylus Thomson, 1859 234
antennatus Stephens, 1834 236
anthracinus Mulsant & Rey, 1861 243
antilope Peyron, 1858 239
Aploderus Stephens, 1832 238
arcuatus (Stephens, 1832) 249
arenarius (Geoffroy, 1785) 237,238
arenarius (Paykull, 1800) 240
arenoides Tottenham, 1939 240
armatus (Panzer, 1799) 239
asper (Mulsant & Rey, 1879) 235
asphaltinus (Waltl, 1838) 238
Astycops Thomson, 1859 238
atratus Stephens, 1834 245
atricapillus (Germar, 1825) 241
aureus (Fauvel, 1872) 247
Bargus Schiodte, 1866 241
basalis (Melsheimer, 1844) 236
Basilewskyorus Fagel, 1957 236
belgicus (Dvorak, 1954) 236
Belidus Mulsant & Rey, 1878 239
benicki Smetana, 1960 248
biarcuatus (Matthews, 1838) 238
bicornis (Germar, 1822) 240
bilineatus (Stephens, 1832) 244
Blediodes Mulsant & Rey, 1878 241
bledioides (Wollaston, 1864) 245
Bledius Leach, 1819 238,239
Boettcherinus Bernhauer, 1936 234
Boopinus Klima, 1904 243
borealis (Motschoulsky, 1860) 235
brachypterus (Marsham, 1802) 238
brassicae (Scopoli 1763) 234
brevicollis Mulsant & Rey, 1861 243
brevipennis (Fauvel, 1869) 234
brevipennis Kiesenwetter, 1850 248
brevissonii (Fauvel, 1865) 249
brunnipennis Stephens, 1832 238
burlei Brisout, 1861 237
Caccoporus Thomson, 1859 236
caelatus (Gravenhorst, 1802) 238
calidus (Kraatz, 1858) 243
caliginosus Stephens, 1832 238
capito Heer, 1839 237
carinatus (Panzer, 1798) 236
Carpelimus Leach, 1819 243,244
castaneidennis Mannerheim, 1830 242
caucasicus (Hochhuth, 1849) 244
championi (Cameron, 1912) 244
chilensis Coiffait & Saiz, 1968 234
ciliatus Kiesenwetter, 1844 248
cinctus Motschoulsky, 1860 243
clypeonitens (Pandellé, 1867) 234
complanatus (Erichson, 1839) 234
Compsochilus Kraatz, 1857 247
constrictus Scriba, 1868 237
cooperi (Cameron, 1951) 243
corniger Rosenhauer, 1856 239
cornutissimus Wollaston, 1864 239
cornutus (Gravenhorst, 1802) 237
corticinus (Gravenhorst, 1806) 245
coussementi (Dvorak, 1954 236
Craetopycrus Tottenham, 1939 237
crassicollis Lacordaire, 1835 241
crenulatus (Broun, 1880) 236
crenulatus Stierlin, 1867 240
cribicollis Baudi, 1848 237
cribicollis Heer, 1839 241
curtipennis (Mulsant & Rey, 1878) 246
curtipennis (Fauvel, 1869) 247
dama Motschoulsky, 1858 240
debilis Erichson, 1840 241
debilis Hochhuth, 1872 238
defectivus Normand, 1839 237
degener Palmén, 1939 237
dehnerti Korge, 1959 242
Deleaster Erichson, 1837 234
DELEASTERINI Reitter, 1909 234
despectus (Mulsant & Rey, 1870) 245
despectus (Baudi, 1870) 245
Dicarenus Gistel, 1834 240
dichrous (Gravenhorst, 1802) 234
dilatatus (Erichson, 1839) 248,249
dispersepunctatus (Scheerpeltz, 1947) .. 245
dissecticollis Roubal, 1918 241
dissimilis Erichson, 1840 241
distinctus (Fairmaire, 1856) 249
divisus (Marsham, 1802) 242
Elbidus Mulsant & Rey, 1878 240
elegans (Luze, 1904) 246
elongatulus (Kraatz, 1858) 248
emarginatus (Fauvel, 1871) 246
Emopotylus Bernhauer, 1910 234
Epomotylus Thomson, 1859 236
erichsoni Hochhuth, 1851 234
erythropeplus Koch, 1938 241
erythropterus Kraatz, 1857 242
Euceratobledius Znojko, 1929 240
evertsi (Bernhauer, 1915) 245
excavatus (Motschoulsky, 1858) 235
exiguus (Erichson, 1839) 245
extensus Motschoulsky, 1860 242
feminalis Renkonen, 1939 238
femoralis (Gyllenhal, 1827) 241
fergussoni Joy, 1912 240
filiformis (Quedenfeldt, 1882) 248
filum (Fauvel, 1872) 247
filum Heer, 1839 241
flavipennis Luze, 1904 238
flavipes (Lacordaire, 1835) 236
flavipes (Stephens, 1834) 235
flexuosus (Fairmaire & Laboulbène, 1856) 247
flexuosus Mulsant & Rey, 1856 246,247
fossor Heer, 1839 239
fossor Wollaston, 1854 238
fossulatus (Motschoulsky, 1857) 244
foveatus Stephens, 1832 238
foveolatus (Sahlberg, 1827) 245
fracticornis (Paykull, 1790) 242
fuliginosus (Gravenhorst, 1802) 243,244
fulvipennis (Fauvel, 1863) 245
funestus Eppelsheim, 1833 239
furcatus (Olivier, 1811) 240,241
fuscipennis Koch, 1934 240
fuscipennis Mannerheim, 1843 237
galeatus Wollaston, 1864 240
gallicus (Gravenhorst, 1806) 241,242
germanicus (Gravenhorst, 1806) 242
glabricollis (Motschoulsky, 1860) 245
gladiator Normand, 1935 240
Glomus Gistel, 1848 244
graciliformis Konzelmann & Lohse, 1981 246
gracilis (Fagel, 1951) 247
gracilis (Mannerheim, 1830) 246
gradensis (Bernhauer, 1914) 245
graellsi Fauvel, 1865 239
grafi (Reitter, 1909) 236
grandicollis Motschoulsky, 1858 239
haemopterus (Stephens, 1834) 242
halophilus (Kiesenwetter, 1844) 246
hamatus (Fairmaire & Laboulbène, 1856) 235
Haploderus Erichson, 1839 238
havelkai (Dvorak, 1954) 236
Hesperophilus Stephens, 1829 241
heterocerus Eppelsheim, 1889 242
heterogaster Fauvel, 1889 248
hirticollis Mulsant & Rey, 1879 249
hispidulus Fairmaire & Laboulbène, 1856 239
hispidus Parfitt, 1857 240
homalinus (Fauvel, 1871) 247
homalinus (Sainte-Claire Deville, 1907) 247
humilis Heer, 1839 237
immunis Stephens, 1832 238
impressus (Lacordaire, 1835) 246
incrassatus (Kiesenwetter, 1850) 246
inquilinus (Erichson, 1839) 246
insecatus Gravenhorst, 1806 235
insularis (Kraatz, 1858) 243
intricatus (Erichson, 1840) 235
inustus (Gravenhorst, 1806) 235
irmleri Coiffait, 1980 240
ixellensis (Dvorák, 1954) 234
januvianus Wollaston, 1864 240
japonicus Motschoulsky, 1862 237
juvencus Erichson, 1840 240
kahrii (Kraatz, 1858) 248
krogeri Scheerpeltz, 1933 242
laetior Mulsant & Rey, 1878 242
laevigatus Fiori, 1915 238
laqueatus (Marsham, 1802) 237
larseni Hansen, 1940 242
lasti (Scheerpeltz, 1946) 245
lathrobiodes (Peyron, 1858) 244
leachii (Curtis, 1830) 234
leederi (Bernhauer, 1940) 245
lindbergi (Scheerpeltz, 1937) 245
linearis Kraatz, 1858 248
littoralis (Mulsant & Rey, 1879) 246
longicornis Lucas, 1846 238
longicornis Mannerheim, 1830 236
longipennis (Fairmaire & Laboulbène, 1856) 247
longipennis (Heer, 1841) 248
longipennis Eppelsheim, 1875 238
longulus Erichson, 1839 242
lucifugus (Fagel, 1951) 247
luteicornis (Mulsant & Rey, 1879) 245
luteipennis Erichson, 1839 237
macellus (Kraatz, 1870) 248
macropterus Wiese, 1875 238
mamillatus Hochhuth, 1851 237
mancus (Casey, 1889) 244
mannerheimi (Kolenati, 1846) 249
marchicus Wagner, 1916 244
maxillosus (Sperk, 1835) 235
maxillosus Peyron, 1858 237
medioitalicus Focarile, 1964 242
mediterraneus (Scheerpeltz, 1950) 247
memnonius (Erichson, 1840) 243
memnonius (Erichson, 1840) 243
Metoxytelus Fagel, Coiffait & Saiz, 1968 234

metuens Mulsant & Rey, 1879 244
Microxytelus Fagel, 1956 234
minarzi Bernhauer, 1929 243
minimus (Runde, 1835) 245
minor Krogerus, 1925 242
minusculus (Motschoulsky, 1861) 245
Misancyrus Gozis, 1886 246
moerens Melsheimer, 1844 236
monachus Bernhauer, 1914 243
monachus Cameron, 1981 243
monocerus Rosenhauer, 1856 240
montivagus (Heer, 1841) 236
mordax (Sahlberg, 1876) 238
morio Heer, 1839 239
morsitans (Paykull, 1792) 238
mulsanti Rosenhauer, 1857 241
Nanolobus Cameron, 1933 243
nanus (Wollaston, 1854) 245
nanus Erichson, 1840 242
Neobledius Abdullah & Qadri, 1968 240
Neoplatystethus Abdullah & Qadri, 1970 234
Neopyctocraerus Abdullah & Qadri, 1970 234
nevesi (Scheerpeltz, 1951) 235
nigricans Erichson, 1840 241
nigricornis (Mulsant & Rey, 1879) 249
nigripennis Bernahuer, 1910 242
nigripennis Gabriel, 1929 242
nigripennis Gridelli, 1934 237
nigrita (Wollaston, 1854) 243
nitens (Sahlberg, 1832) 238
nitens Stephens, 1832 237
nitidulus (Gravenhorst, 1802) 235
nitidus (Baudi, 1848) 244
nitidus Stephens, 1832 235
nodifrons Mannerheim, 1830 238
nuchicornis Mulsant & Rey, 1861 240
obesus (Kiesenwetter, 1844) 244
oblitus Mulsant & Rey 1879 247
obscurus Stephens, 1834 244
obsoletus (Mulsant & Rey, 1878) 246
occidentalis Bondroit, 1907 242
Ochthephilus Mulsant & Rey, 1856 246
Ochthphilinus Eichelbaum, 1915 246
omalinus (Erichson, 1840) 247
Oncoparia Bernhauer, 1936 234
opacus (Block, 1799) 242
opacus Mulsant & Rey, 1878 248
opacus Stephens, 1832) 236
OXYTELINAE Fleming, 1821 234
OXYTELINI Fleming, 1821 234
oxytelinus Fauvel, 1875 238
Oxytelodes Bernhauer, 1908 234
Oxytelops Fagel, 1956 234
Oxytelosus Cameron, 1950 234
Oxytelus Gravenhorst, 1802 ..234,236,237
Oxytrogus Wendelere, 1930 243
pallidipennis (Panzer, 1795) 238
pallidipennis Bernhauer, 1906 237
pallipes (Gravenhorst, 1806) 242
pallipes (Stephens, 1832) 234
palpalis (Erichson, 1839) 247,248
papuensis (Fauvel, 1879) 243
Paraboopinus Scheerpeltz, 1937 244
Paracoccoporus Steel, 1948 234
Paratrogophloeus Hatch, 1957 244
parvulus (Eppelsheim, 1878) 247
parvulus (Mulsant & Rey, 1861) 246
pedicellus (Gravenhorst, 1802) 235
pfaundleri Benick, 1937 242
Phloeonaeus Erichson, 1839 238
piceus (Linné, 1767) 237
picipennis Stephens, 1834 236,245
pilosellus Wankowicz, 1869 237
plagiatus (Kiesenwetter, 1850) 249
plagiatus (Rosenhauer, 1856) 235
plagiatus Motschoulsky, 1860 237
plagifer Gemminger & Harold, 1868 237
Planeustomus Jacquelin du Val, 1857 247
Platystethus Mannerheim, 1830 237,238
plugialis Coiffait, 1976 240
politus (Kiesenwetter, 1850) 244
praetermissus Williams, 1929 241
praetor Smetana, 1959 248
Pseudodelopsis Fagel, 1957 234
Pseudoplatystethus Abdullah & Qadri, 1970 234
Pseudopyctocraerus Abdullah & Qadri, 1970 234
pubescens Kolenati, 1846 239
Pucerus Mulsant & Rey, 1878 243
pulcher (Gravenhorst, 1802) 236
pullus (Broun, 1880) 236
pumilus (Erichson, 1839) 236
punctatus (LeConte, 1877) 235
punctatus Fiori, 1915 238
punctipennis (Kiesenwetter, 1850) 245
pusillus (Gravenhorst, 1802) 244,245
pusillus (Mannerheim, 1830) 236
pusillus (Stephens, 1834) 244
Pyctocraerus Thomson, 1859 237
riparius (Lacordaire, 1835) 244
rivularis (Motschoulsky, 1860) 244
rivularis (Smetana, 1967) 246
rondaensis (Fagel, 1957) 245
rosenhaueri (Kiesenwetter, 1850) 247
ruddi Stephens, 1832 241
ruficornis (Reitter, 1909) 247
ruficornis Mulsant & Rey, 1878 242
ruficrus (Stephens, 1834) 235
rufipennis Stephens, 1834 245
rufipennis Erichson, 1840 241
rugosus (Fabricius, 1775) 236
scaber (Roshenauer, 1856) 235
scrobiculatus (Erichson, 1840) 249
sculpturatus (Gravenhorst, 1806) 234,236
sculptus Gravenhorst, 1806 236
scybalarius Runde, 1835 237
secerdendus Joy, 1911 240
secernendus Joy, 1912 240
sharpi Fowler & Donisthorpe, 1913 242
simpliciventris Apfelbeck, 1906 241
sinuatocollis Gerhardt, 1899 242
skrimshiranus Curtis, 1826 241
sobrinus (Fairmaire & Germain, 1861) 244
spectabilis Kraatz, 1857 239
spectatus (Casey, 1889) 244
speculifrons (Kraatz, 1858) 236
spinipes (Block, 1799) 238
spiniventris (Reitter, 1907) 236
spinosus Erichson, 1840 238
splendens Heer, 1839 238
spretus (Casey, 1889) 244
STAPHYLINIDAE Latreille, 1802 234
stephensi Westwood, 1827 241
Stictancyrus Scheerpeltz, 1950 246
striatulus Heer, 1839 238
striatus (Ström, 1768) 236
striolatus Lacordaire, 1835 238
Styloxys Gozis, 1886 234
subaequus (Mulsant & Rey, 1879) 244
subangulatus (Jarrige, 1964) 246
subanophthalmicus Outerelo, Gamarra & Salgado, 1998 236
subniger Schneider, 1898 240
subnitidus (Reitter, 1909) 235
subrugulosus (Mulsant & Rey, 1878) 246
subsinuatus Mulsant & Rey, 1878 242
subterraneus Erichson, 1839 239
sulcatus (Geoffroy, 1785) 236
sulcatus (O.Müller, 1776) 237
sulcatus Gebler, 1848 237
sulcicollis Koch, 1938 241
sus Aubé, 1850 241
suspectus (Mulsant & Rey, 1879) 244
Tadunus Schiodte, 1866 241
Taenosoma Mannerheim, 1830 244
talpa (Gyllenhal, 1810) 238
tantillus (Casey, 1889) 245
Tanycraerus Thomson, 1859 237
tarsalis (Hochhuth, 1849) 244
taurus (Germar, 1825) 241
tenellus (Erichson, 1839) 246
terrestris (Heer, 1839) 236
terrestris (Lacordaire, 1835) 236
testaceicolor Roubal, 1941 234
testaceipennis Fairmaire & Germain, 1861 236
tetracarinatus (Block, 1799) 236
thessalonicensis (Scheerpeltz, 1963) 245
THINOBIINI Shalberg 1876 238
Thinobius Kiesenwetter, 1844 238,248
Thinodromus Kraatz, 1857 248
Thinodromus s.str. Kraatz, 1857 249
Thinophilus Mulsant & Rey, 1878 248
Thiphonilus Tottenham, 1939 248
Thoracoplatynus Scheerpeltz, 1937 243
tibialis Heer, 1839 239
Torrentomus Bierig, 1934 248
transversalis (Wollaston, 1857) 249
triangulum Baudi, 1848 239
tricornis (Herbst, 1784) 238,239
tricornis Fairmaire, 1854 239
trilobus (Olivier, 1795) 238
tristis Aubé, 1843 243
tristis Mulsant & Rey, 1861 237
Troginus Mulsant & Rey, 1878 245
Trogophloeus Mannerheim, 1830 245
tunisius (Bernhauer, 1932) 235
unicornis (Germar, 1825) 240
venustulus (Rosenhauer, 1856) 247
verres Erichson, 1840 243
vitulus Erichson, 1840 240
wankowiczi Hochhuth, 1872 238
Warburtonia Oke, 1933 248
weberi (Quedenfeldt, 1882) 247
wenckeri Fauvel, 1863 248
winkleri Bernhauer, 1905 240
Yosiityphlus Sawada, 1971 248